

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	キャベジンコーワα											
2	成分・分量	6錠中 メチルメチオニンスルホニウムクロリド 150.0mg、 炭酸水素ナトリウム 700.0mg、炭酸マグネシウム 250.0mg、 沈降炭酸カルシウム 1200.0mg、 ロートエキス 3倍散 90.0mg(ロートエキスとして 30.0mg)、 ソヨウ乾燥エキス 30.0mg(ソヨウとして 270.0mg)、センブリ末 30.0mg、 ビオチアスターゼ 2000 24.0mg、リパーゼAP12 15.0mg											
3	用法・用量	下記の量を毎食後水又は温湯で服用してください。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>1日服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人(15歳以上)</td><td>2錠</td><td rowspan="2">3回</td></tr><tr><td>8歳以上15歳未満</td><td>1錠</td></tr><tr><td>8歳未満の小児</td><td colspan="2">服用しないこと</td></tr></tbody></table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人(15歳以上)	2錠	3回	8歳以上15歳未満	1錠	8歳未満の小児	服用しないこと	
年齢	1回量	1日服用回数											
成人(15歳以上)	2錠	3回											
8歳以上15歳未満	1錠												
8歳未満の小児	服用しないこと												
4	効能・効果	胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、消化促進、胃部・腹部膨満感、胃重											
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 排尿困難 ・次の診断を受けた人。 腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害											
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項												

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。