

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ナリピタン
2	成分・分量	9錠中 ニコチン酸アミド 180mg、カフェイン水和物 180mg、パパペリン塩酸塩 45mg、チアミン塩化物塩酸塩（ビタミンB1） 90mg、リボフラビン（ビタミンB2） 9mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 18mg、アロエ末 18mg、アミノ安息香酸エチル 270mg
3	用法・用量	1回2～3錠、1日3回毎食後に水またはお湯で服用してください ●15才未満は服用しないこと
4	効能・効果	耳鳴症、皮膚炎、蕁麻疹（じんましん）、にきび、吹出物、肩こり
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	■してはいけないこと 1. 次の人は服用しないこと 15才未満の小児 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬など） 3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないこと （眠気などがあられることがある） 4. 長期連用しないこと ■相談すること 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること （1）医師の治療を受けている人 （2）妊婦または妊娠していると思われる人 （3）薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人 （4）今までに他の抗ヒスタミン剤、乗物酔い薬、かぜ薬、鎮咳去痰薬などによりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみなど）を起こしたことがある人 （5）次の症状のある人：排尿困難 （6）次の診断を受けた人：緑内障（例えば、目の痛み、目のかすみなど）、心臓病
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。