

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	フェミニーナ 膣カンジダ錠
2	成分・分量	1日量（1錠）中 有効成分 分量 はたらき オキシコナゾール硝酸塩 100mg 膣カンジダの原因であるカンジダ菌を殺菌する
3	用法・用量	年齢 1回量 使用回数
		大人（15才以上 60才未満） 1錠 1日1回
		15才未満または60才以上 × 使用しないこと
4	効能・効果	膣カンジダの再発（以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>■してはいけないこと</p> <p>1. 次の人は使用しないこと</p> <p>(1)以前に医師から膣カンジダの診断・治療を受けたことがない人</p> <p>(2)膣カンジダの再発までの期間が2ヶ月以内の人、または2ヶ月以上であっても、直近6ヶ月以内に2回以上感染した人</p> <p>(3)膣カンジダの再発かどうかよく分からない人 (おりものが、おかゆ（カッターチーズ）状、白く濁った酒かす状ではない、いやなおいがあるなどの場合、他の疾患の可能性が考えられる)</p> <p>(4)発熱、悪寒がある人 (5)吐き気、嘔吐がある人 (6)下腹部に痛みがある人</p> <p>(7)背中や肩に痛みがある人 (8)不規則な出血または異常な出血、血の混じったおりものがある人 (9)膣または外陰部に潰瘍、水膨れまたは痛みがある人</p> <p>(10)排尿痛がある人または排尿困難な人 (11)次の診断を受けた人：糖尿病</p> <p>(12)ワルファリンなどの抗凝血薬を使用している人 (13)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (14)妊婦または妊娠していると思われる人</p> <p>(15)15才未満の小児または60才以上の高齢者</p> <p>2. 本剤を使用中は、次の医薬品を外陰部に使用しないこと</p> <p><u>フェミニーナ軟膏 S などカンジダ治療薬以外の外皮用薬</u></p> <p>■相談すること</p> <p>次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること</p> <p>(1)医師の治療を受けている人 (2)授乳中の人</p> <p>(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。