

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	クレンジル											
2	成分・分量	<p>1日量(9カプセル)中</p> <p>アカメガシワエキス 0.5g(原生薬換算量5g)</p> <p>ゲンノショウコエキス 0.2g(原生薬換算量2g)</p> <p>アロエ末 0.15g</p> <p>ダイオウエキス 20mg(原生薬換算量0.2g)</p> <p>薬用炭 0.4g</p>											
3	用法・用量	<p>次の量を食前または食後に水またはお湯で服用してください</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大人(15才以上)</td> <td>3カプセル</td> <td rowspan="2">3回</td> </tr> <tr> <td>11才以上15才未満</td> <td>2カプセル</td> </tr> <tr> <td>11才未満</td> <td colspan="2">× 服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日服用回数	大人(15才以上)	3カプセル	3回	11才以上15才未満	2カプセル	11才未満	× 服用しないこと	
年齢	1回量	1日服用回数											
大人(15才以上)	3カプセル	3回											
11才以上15才未満	2カプセル												
11才未満	× 服用しないこと												
4	効能・効果	便秘、整腸(便通を整える)、軟便、胃部・腹部膨満感、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、食べすぎ(過食)、飲みすぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐											
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>■してはいけないこと 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること</p> <p>■相談すること: 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること</p> <p>(1)医師の治療を受けている人</p> <p>(2)妊婦または妊娠していると思われる人</p> <p>(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(4)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)</p> <p>(5)胃腸が弱く下痢しやすい人</p>											
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項												

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止しすぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。