

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アオキュア											
2	成分・分量	<table border="1"> <thead> <tr> <th>成分 100g中</th> <th>分量</th> <th>はたらき</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポリエチレンスルホン酸ナトリウム</td> <td>1g</td> <td>うっ血(血が滞ること)をとり、血行を促進し、打ち身などによる青あざを伴う内出血を改善します</td> </tr> <tr> <td>ニコチン酸ベンジルエステル</td> <td>0.125g</td> <td>吸収促進作用があり、ポリエチレンスルホン酸ナトリウムの働きを高めます</td> </tr> </tbody> </table> <p>※添加物は添付文書を参照 <成分・分量に関連する注意> 本剤の血行促進作用により、塗擦後約10分で皮ふが赤くなったり、温かく感じたりすることがありますが、1～2時間位でもとに戻ります</p>			成分 100g中	分量	はたらき	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム	1g	うっ血(血が滞ること)をとり、血行を促進し、打ち身などによる青あざを伴う内出血を改善します	ニコチン酸ベンジルエステル	0.125g	吸収促進作用があり、ポリエチレンスルホン酸ナトリウムの働きを高めます
成分 100g中	分量	はたらき											
ポリエチレンスルホン酸ナトリウム	1g	うっ血(血が滞ること)をとり、血行を促進し、打ち身などによる青あざを伴う内出血を改善します											
ニコチン酸ベンジルエステル	0.125g	吸収促進作用があり、ポリエチレンスルホン酸ナトリウムの働きを高めます											
3	用法・用量	患部に適量を1日1～数回塗擦するか、またはガーゼなどにのばして貼付する											
4	効能・効果	外傷(打ち身、ねんざなど)による腫れ・内出血、やけど・けがによる傷跡、しもやけ、手指の角化、肩こり、筋肉痛											
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>【してはいけないこと】 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は使用しないこと: 出血しやすい又は出血が止まりにくい人 次の部位には使用しないこと <ol style="list-style-type: none"> 目や目の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膣等)等 損傷皮ふ 湿疹・湿潤、かぶれ、ただれ <p>【相談すること】</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること <ol style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 患部が顔面や広範囲の人 											
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項												

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。