

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	サンテFXネオ												
2	成分・分量	<table border="0"> <tr> <td>ネオスチグミンメチル硫酸塩</td> <td>0.005%</td> </tr> <tr> <td>タウリン</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>L-アスパラギン酸カリウム</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>塩酸テトラヒドロゾリン</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>0.03%</td> </tr> <tr> <td>イプシロン-アミノカプロン酸</td> <td>1.0%</td> </tr> </table>	ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	タウリン	1.0%	L-アスパラギン酸カリウム	1.0%	塩酸テトラヒドロゾリン	0.05%	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	イプシロン-アミノカプロン酸	1.0%
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%													
タウリン	1.0%													
L-アスパラギン酸カリウム	1.0%													
塩酸テトラヒドロゾリン	0.05%													
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%													
イプシロン-アミノカプロン酸	1.0%													
3	用法・用量	1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。												
4	効能・効果	目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感												
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人</p> <p>(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(3) 次の症状のある人</p> <p>はげしい目の痛み</p> <p>(4) 次の診断を受けた人</p> <p>緑内障</p> <p>2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。</p> <p>[関係部位: 症状]</p> <p>皮ふ: 発疹・発赤、かゆみ</p> <p>目: 充血、かゆみ、はれ、しみて痛い</p> <p>3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください</p> <p>(1) 目のかすみが改善されない場合</p> <p>(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合</p>												
6	薬剤師が必要と判断する事項													

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。