

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第2類医薬品		使用前には必ず添付文書を読んで下さい
1	名称	サンテアスティ抗菌
2	成分・分量	スルファメトキサゾール 4. 0% クロルフェニラミンマレイン酸塩 0. 03% グリチルリチン酸二カリウム 0. 25% タウリン 0. 5%
3	用法・用量	1回 1~2滴、1日3~5回点眼してください。
4	効能・効果	結膜炎(はやり目)、ものもらい、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の症状のある人 はげしい目の痛み 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。 関係部位　　症　状 皮ふ　　発疹・発赤、かゆみ 目　　充血、かゆみ、はれ、しみて痛い 3. 3~4日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
6	薬剤師が 必要と判断 する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。