

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ストマオフ糖衣錠
2	成分・分量	1日量（3錠）中 ブチルスコポラミン臭化物 30.0mg
3	用法・用量	成人（15才以上）1回1錠を、1日3回を限度として服用してください なお、服用間隔は4時間以上おいてください 15才未満は服用しないでください
4	効能・効果	胃痛、腹痛、さしこみ（ <small>せんつう</small> 疝痛、 <small>しゃく</small> 瘕）、胃酸過多、胸やけ <small>せんつう</small> 疝痛：内臓がキリキリとけいれんを起こすような痛み <small>しゃく</small> 瘕：かなりつらい発作のような痛み
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないでください 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬、抗ヒスタミン剤 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・本人又は家族がアレルギー体質の人 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人 排尿困難 ・次の診断を受けた人 心臓病、緑内障
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。