

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	セピーIPかぜゴールド錠
2	成分・分量	1日量(9錠)中 イブプロフェン 450mg、ブロムヘキシン塩酸塩 12mg、ジヒドロコデインリン酸塩 22mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、メキタジン 4mg、グリチルリチン酸 39mg、無水カフェイン 75mg、リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> ) 12mg
3	用法・用量	成人(15才以上)1回3錠、1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください 15才未満は服用しないでください
4	効能・効果	かぜの諸症状(発熱、頭痛、のどの痛み、せき、鼻水、鼻づまり、悪寒、くしゃみ、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人</p> <p>(3)15才未満の小児</p> <p>(4)出産予定日12週以内の妊婦</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります)</p> <p>4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>5. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>6. 5日間を超えて服用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師又は歯科医師の治療を受けている人</li> <li>・妊婦又は妊娠していると思われる人</li> <li>・高齢者</li> <li>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>・次の症状のある人 高熱、排尿困難</li> <li>・次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</li> <li>・次の病気にかかったことのある人 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病</li> </ul>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。