

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	プレバリンα クール軟膏
2	成分・分量	100g中 プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g、ビタミンE酢酸エステル 0.5g、リドカイン 1g、イソプロピルメチルフェノール 0.1g
3	用法・用量	1日数回、適量を患部に塗布してください
4	効能・効果	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の部位には使用しないでください (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部 (2)目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)</p> <p>2. 顔面には広範囲に使用しないでください</p> <p>3. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none">・医師の治療を受けている人・妊婦又は妊娠していると思われる人・本人又は家族がアレルギー体質の人・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人・患部が広範囲の人・湿潤やただれのひどい人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。