

医薬品を正しく購入するための  
**説明文書**

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	キュウメタシンパップZ
2	成分・分量	膏体100g(1000cm <sup>2</sup> )中 インドメタシン 0.5g ※添加物は外箱を参照
3	用法・用量	ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい。 <用法・用量に関連する注意> (1)使用法を厳守して下さい。 (2)15歳未満の小児に使用させないで下さい。 (3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。 (4)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用して下さい。 (5)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。
4	効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、打撲、捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないで下さい。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)ぜんそくを起こしたことがある人 (3)15歳未満の小児 2. 次の部位には使用しないで下さい。 (1)目の周囲、粘膜等 (2)しっしん、かぶれ、傷口 (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部 3. 連続して2週間以上使用しないで下さい。 次に該当する人はお申し出下さい。 (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。