

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第3類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ビトン-ハイリッチ
2	成分・分量	<p>3 包(1包2g)中 アスコルビン酸(ビタミンC) 2000mg、酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)300mg、 リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂ 酪酸エステル) 12mg、 ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)15mg</p> <p><成分・分量に関連する注意> (1)本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。 医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に 知らせて下さい。 (2)本剤に配合されているリボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂ 酪酸エステル)により、 尿が黄色になることがあります。 ※添加物は外箱、添付文書を参照</p>
3	用法・用量	<p>次の1回量を1日1~3回、服用して下さい。 ただし、1日2回服用する場合は朝食及び夕食後、 1日3回服用する場合は毎食後服用して下さい。 15歳以上:1包 11歳以上15歳未満:2/3包 7歳以上11歳未満:1/2包 3歳以上7歳未満:1/3包 1歳以上3歳未満:1/4包 1歳未満:服用しないで下さい。</p>
4	効能・効果	<p>●次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着 ●末梢血行障害による次の諸症状の緩和:肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ ●次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻出血 「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、 薬剤師又は歯科医師に相談して下さい」 ●次の場合のビタミンECの補給:肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期</p>
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>次に該当する人はお申し出下さい。 (1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。