

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第1類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	セレキノンS
2	成分・分量	成分(1日量:3錠中) トリメブチンマレイン酸塩 300mg
3	用法・用量	成人(15才以上)1回1錠を1日3回、食前又は食後に水又はお湯でかますに服用してください。
4	効能・効果	過敏性腸症候群の次の諸症状の緩和:腹痛又は腹部不快感を伴い、繰り返し又は交互にあらわれる下痢及び便秘(以前に医師の診断・治療を受けた人に限ります。)
5	保健衛生上の 危害を防止 するため 必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください。</p> <p>(1)医師から過敏性腸症候群の診断・治療を受けたことがない人。</p> <p>(2)過敏性腸症候群の再発かどうかよくわからない人(例えば、今回の症状は、以前に過敏性腸症候群の診断・治療を受けた時と違う)。</p> <p>(3)就寝中などの夜間にも、排便のためにトイレに行きたくなったり、腹痛がある人。</p> <p>(4)発熱がある人。</p> <p>(5)関節痛がある人。</p> <p>(6)粘血便(下血)がある人。</p> <p>(7)繰り返すひどい下痢がある人。</p> <p>(8)急性の激しい下痢がある人。</p> <p>(9)排便によってよくならない腹痛がある人。</p> <p>(10)嘔吐がある人。</p> <p>(11)6ヶ月以内に、体重が3kg以上、予期せず減少した人。</p> <p>(12)大腸がん、炎症性腸疾患(クロhn病、潰瘍性大腸炎等)の既往がある人。</p> <p>(13)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(14)15才未満の小児。</p> <p>2. 長期連用しないでください。</p> <p>3. 次に該当する人はお申し出ください。</p> <p>・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>・授乳中の人。 ・50才以上の人。 ・貧血がある人。</p> <p>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>・次の診断を受けた人。 肝臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、副甲状腺機能亢進症</p> <p>・大腸がん、炎症性腸疾患の家族がいる人。 ・腹痛、便秘がひどい人。</p>
6	薬剤師が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。