医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名称 | コンジスイとんぷく |
| 2 | 成分・分量 | 1包(1．3g)中　エテンザミド500mg、アセトアミノフェン300mg、<br>ブロモバレリル尿素180mg、無水カフェイン80mg、<br>添加物としてセルロース、サッカリンNa水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、<br>無水ケイ酸、香料、乳糖水和物を含有 |
| 3 | 用法・用量 | 15才以上、1回1包。11才以上15才未満1回2/3包。<br>7才以上11才未満、1回1/2包。<br>※ 1日2回を限度とし、なるべく空腹をさけて服用ください。服用間隔は6時間以上おいてください。 |
| 4 | 効能・効果 | 歯痛・抜歯後の痛みを鎮める。頭痛・月経痛(生理痛)・神経痛・肩こり痛・腰痛・咽頭痛・耳痛・関節痛・筋肉痛・打撲痛・ねんざ痛を鎮める。悪感・発熱時の解熱。 |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 1．次の人は服用しないで下さい<br>(1)本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人<br>(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人<br>(3)7歳未満の小児<br>2．本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください<br>他の解熱鎮痛剤、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬<br>3．服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください<br>4．服用時は飲酒しないでください。<br>5．長期連用しないでください<br>次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師などの専門家に相談してください<br>(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人<br>(2)妊婦又は妊娠していると思われる人<br>(3)水疱(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある小児(15歳未満)<br>(4)高齢者<br>(5)本人又は家族がアレルギー体質の人<br>(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人<br>(7)次の診断を受けた人　心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍 |
| 6 | 薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項 | |

〔注意事項〕

1．本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。

2．情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。

3．使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。