

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新スピード膏S
2	成分・分量	本品1.0m ² 中 ノニル酸ワニリルアミド 0.15g サロコール(サリチル酸グリコール) 3.00g
3	用法・用量	1. 膏面を覆っているライナーをはがし、患部に直接貼り、四隅はよくおさえてください。 2. 1日数回、お貼りください。
4	効能・効果	肩こり、腰痛、筋肉痛、打撲、捻挫、関節痛、筋肉疲労、しもやけ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次の部位には使用しないこと (1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。 次に該当する人はお申し出下さい。 ・本人又は家族がアレルギー体質の人。 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。