

医薬品を正しく購入するための 説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	小児用チルダン鼻炎シロップS												
2	成分・分量	1日量(60mL)中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg、カンゾウエキス(カンゾウとして200mg) 50mg 添加物として果糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料、白糖、カラメルを含有する。												
3	用法・用量	1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用して下さい。場合により1日6回まで服用して差し支えありませんが、原則として4時間の間隔をおいて服用して下さい。 <table border="0"> <tr> <td>年齢</td> <td>1回量</td> </tr> <tr> <td>3才以上7才未満</td> <td>10.0mL</td> </tr> <tr> <td>1才以上3才未満</td> <td>7.5mL</td> </tr> <tr> <td>6ヵ月以上1才未満</td> <td>6.0mL</td> </tr> <tr> <td>3ヵ月以上6ヵ月未満</td> <td>5.0mL</td> </tr> <tr> <td>3ヵ月未満</td> <td>服用しないこと</td> </tr> </table>	年齢	1回量	3才以上7才未満	10.0mL	1才以上3才未満	7.5mL	6ヵ月以上1才未満	6.0mL	3ヵ月以上6ヵ月未満	5.0mL	3ヵ月未満	服用しないこと
年齢	1回量													
3才以上7才未満	10.0mL													
1才以上3才未満	7.5mL													
6ヵ月以上1才未満	6.0mL													
3ヵ月以上6ヵ月未満	5.0mL													
3ヵ月未満	服用しないこと													
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:くしゃみ、鼻水(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)												
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい 他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい 長期連用しないで下さい <p>次に該当する人はお申し出下さい</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人。・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・授乳中の人。・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・高熱、排尿困難の症状のある人。 ・緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧の診断を受けた人。 <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい】</p>												
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項													

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。