医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	小児用チルダンせきどめシロップS
2	成分・分量	1日量(60mL)中 ジヒドロコデインリン酸塩 10mg、dl－メチルエフェドリン塩酸塩 25mg、グアイフェネシン 100mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg、ナンテンジツ流エキス(ナンテンジツとして340mg) 0.34mL、キキョウ流エキス(キキョウとして150mg) 0.15mL、セネガ流エキス(セネガとして150mg) 0.15mL 添加物としてD－ソルビトール、クエン酸、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料、白糖、カラメルを含有する。
3	用法・用量	1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用して下さい。場合により1日6回まで服用して差し支えありませんが、原則として4時間の間隔をおいて服用して下さい。 年齢 1回量 5才以上8才未満 10.0mL 3才以上5才未満 7.5mL 1才以上3才未満 6.0mL 3ヵ月以上1才未満 3.0mL 3ヵ月未満 服用しないこと
4	効能・効果	せき、たん。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬。 2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい 3.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい 4.過量服用・長期連用しないで下さい 次に該当する人はお申し出下さい ・医師の治療を受けている人。・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。・本人又は家族がアレルギー体質の人。・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・高熱、排尿困難の症状のある人。 ・心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害の診断を受けた人。 [小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください]
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1．本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。

2．情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。

3．使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。