

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	マスチゲン錠
2	成分・分量	1回1錠中 溶性ピロリン酸第二鉄 79.5mg 葉酸 1mg ビタミンB12 50 μ g ビタミンC 50mg ビタミンE 10mg
3	用法・用量	成人(15歳以上)、1回1錠を1日1回 食後服用して下さい。 朝昼晚いつ飲んでも構いません。
4	効能・効果	貧血
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 医師の治療を受けている人。 妊婦又は妊娠していると思われる人。 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用 を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 皮膚：発疹・発赤・かゆみ 消化器：吐き気・嘔吐・食欲不振・胃部不快感・腹痛 3. 服用後、便秘、下痢があらわれることがあるので、このような症状の持続又は 増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録 販売者に相談して下さい。 4. 2週間位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この箱を持って医 師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の
薬剤師または登録販売者にご相談下さい。