

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	漢方ラックル顆粒
2	成分・分量	1 日量 2 包 5.4g 中 牛車腎気丸エキス 4.8g ポタンピ 3.0g ジオウ 5.0g ゴシツ 3.0g サンシュユ 3.0g サンヤク 3.0g シャゼンシ 3.0g タクシャ 3.0g ブクリヨウ 3.0g ケイヒ 1.0g ブシ末 1.0g
3	用法・用量	成人(15 歳以上), 1 回 1 包を 1 日 2 回朝夕、食膳又は食間(食後、2~3 時間)にそのまま水かお湯と一緒に服用して下さい。又はお湯に溶かしてかき混ぜてから服用して下さい。1 ヶ月程度を目安に服用して下さい。
4	効能・効果	体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、時に口渴があるものの次の諸症: 下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人(2) 妊娠又は妊娠していると思われる人。(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。(4) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。(5) 今までに薬などにより発疹・赤発、かゆみ等を起こしたことがある人。 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。皮膚: 発疹・赤発、かゆみ 消化器: 食欲不振、胃部不快感、腹痛 その他: 動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ まれに次の重篤な症状が起こる事があります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。間質性肺炎: 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これからは急にあらわれたり、持続したりする。肝機能障害: 発熱、かゆみ、発疹、黄疸、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 3. 服用後下痢があらわれることがあるので、下痢の持続または増強が見られた場合には服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売しに相談して下さい。 4. 1 ヶ月くらい服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売しに相談して下さい。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。