

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	フェイタスZ α ローション				
2	成分・分量	含量(100g中)ジクロフェナクナトリウム 1g、L-メントール 3g 添加物:アジピン酸ジイソプロピル、イソプロパノール、乳酸、プロピレングリコール、ポリソルベール80を含有します。				
3	用法・用量	1日3~4回、適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。 <用法・用量に関連する注意> (1)15歳未満の小児に使用させないでください。(2)用法・用量を厳守してください。(3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけに使用してください。(4)外用のみに使用してください。(5)1週間あたり、50mlを超えて使用しないでください。(6)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(7)同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。(8)通気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしないでください。				
4	効能・効果	腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手、手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ				
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。) 1.次の人は使用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。 2.次の部位には使用しないでください。 (1)目の周囲、粘膜等。(2)皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等)。(3)湿疹、かぶれ、傷口。(4)みずむし・たむし等又は化膿している患部。 3.本剤を服用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください。 4.長期連用しないでください。</p> <p>相談すること 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 (1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)次の医薬品の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤。 2.使用中又は使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談ください。</p> <table border="1"><thead><tr><th>関係部位</th><th>症状</th></tr></thead><tbody><tr><td>皮膚</td><td>発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水疱、落屑(皮膚片の細かい脱落)</td></tr></tbody></table>	関係部位	症状	皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水疱、落屑(皮膚片の細かい脱落)
関係部位	症状					
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水疱、落屑(皮膚片の細かい脱落)					

		<p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>症状の名称</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ショック (アナフィラキシー)</td> <td>使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。</td> </tr> <tr> <td>接触皮膚炎 光線過敏症</td> <td>塗擦・塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱、ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がる場合があります。また日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。</p> <p>保管及び取扱い上の注意</p> <p>(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。</p> <p>(2)小児の手の届かない所に保管してください。</p> <p>(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)</p> <p>(4)火気に近づけないでください。</p> <p>(5)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。</p> <p>(6)使用期限をすぎた商品は使用しないでください。</p>	症状の名称	症状	ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。	接触皮膚炎 光線過敏症	塗擦・塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱、ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がる場合があります。また日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。
症状の名称	症状							
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。							
接触皮膚炎 光線過敏症	塗擦・塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱、ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がる場合があります。また日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。							
6	薬剤師が必要と判断する事項							

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。