

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	浅田飴せきどめCL
2	成分・分量	12錠(1日量)中 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg クレゾールスルホン酸カリウム 135mg セチルピリジニウム塩化物水和物 3mg
3	用法・用量	次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用 服用間隔は2時間以上おく [年齢] [1回量] [服用回数] 11才以上 2錠 1日6回 5才以上11才未満 1錠 1日6回 5才未満 服用しないこと
4	効能・効果	せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、たん、のどの炎症による声かれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・授乳中の人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・高熱のある人 ・心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害の診断を受けた人 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。