

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	金蛇精(糖衣錠)
2	成分・分量	3錠(成人1回量)中 ・メチルテストステロン 3.0mg ・DL-メチオニン 20.0mg ・ルチン水和物 20.0mg ・チアミン硝化物 3.0mg ・リボフラビン 1.0mg ・ニコチン酸アミド 30.0mg ・アスコルビン酸 30.0mg ・タウリン 45.0mg ・ニンジン 100.0mg ・オウレン 50.0mg ・ハンピ末 300.0mg ・カシュウ末 70.0mg ・インヨウカク末 70.0mg ・サンヤク末 70.0mg ・ビヤクシ末 50.0mg
3	用法・用量	通常成人(15歳以上)1回3錠、1日2~3回、水又はお湯で服用してください。
4	効能・効果	●男子更年期障害及びその随伴症状 精力減退、視力減退、記憶力減退、全身倦怠、頭重、五十肩 ●男子更年期以降に於ける男性ホルモン分泌不足による諸症 性欲欠乏、性感減退、勃起力減退、陰萎、遺精
5	保健衛生上の 危害を防止す るために必要 な事項	してはいけないこと 1. 次の人は服用しないでください。 (1)アンドロゲン依存性腫瘍(例えば前立腺癌)及びその疑いのある人 (腫瘍の悪化をうながすことがあります。) (2)肝機能障害のある人(症状が増悪することがあります。) (3)女性 (4)15歳未満の小児 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 ワルファリンカリウム等の抗凝血薬、男性ホルモンを含んだ医薬品、他の勃 起不全治療薬 相談すること 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。 (1)医師の治療を受けている人 (2)高齢者(アンドロゲン依存性腫瘍が潜在化している可能性があるため) (3)次の症状のある人 排尿困難 (4)次の診断を受けた人 前立腺肥大症、肝臓病、心臓病、腎臓病、高血圧
6	薬剤師が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。