

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	パスタタイム FX シップ
2	成分・分量	膏体 100g 中 フェルビナク 0.5g 添加物として L-メントール, ゼラチン, D-ソルビトール液(70%), 濃グリセリン, ポリアクリル酸部分中和物, カルボキシビニルポリマー, ポリビニルアルコール(部分けん化物), パラオキシ安息香酸プロピル, パラオキシ安息香酸メチル, ジイソプロパノールアミン, ヒマシ油, エデト酸ナトリウム水和物, pH 調節剤, その他 2 成分
3	用法・用量	表面のライナーをはがし, 1 日 2 回を限度として患部に貼付する。
4	効能・効果	打撲, 捻挫, 筋肉痛, 腰痛, 関節痛, 腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ), 肘の痛み(テニス肘など), 肩こりに伴う肩の痛み
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1)今までに本剤によるアレルギー症状(例えば発疹, 発赤, かゆみ, かぶれなど)を起こしたことがある人 (2)ぜんそくを起こしたことがある人 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人 (4)15 歳未満の小児 2. 次の部位には使用しないでください (1)目の周囲, 粘膜など (2)湿疹, かぶれ, 傷口 (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部 3. 連続して 2 週間以上使用しないでください  次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・本人又は家族がアレルギー体質の人 ・今までに薬や化粧品などによるアレルギー症状(例えば発疹, 発赤, かゆみ, かぶれなど)を起こしたことがある人  用法・用量に関連する注意 ・定められた用法・用量を守ってください。 ・本剤は, 痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく, 痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので, 症状がある場合だけ 使用してください。 ・汗をかいたり皮ふがぬれている時は, よくふき取ってから使用してください。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。