

## 医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新コフチン液
2	成分・分量	60mL中 ジヒドロコデインリン酸塩 30mg、 di-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg、 無水カフェイン 75mg、カンゾウエキス 850mg(原生薬換算量 4, 250mg)、 セネガエキス 60mg(原生薬換算量 600mg)
3	用法・用量	添付の計量カップで次の量をはかり、通常1日3回食後に服用してください。なお、場合により1日6回まで服用しても差し支えありませんが、この場合は服用間隔を4時間以上おいてください。 成人(15才以上):10mL:1日3回、8~14才:5mL:1日3回、 5~7才:3mL:1日3回、5才未満:服用しないでください
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)</p> <p>2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください</p> <p>3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>4. 過量服用・長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師の治療を受けている人</li> <li>・妊婦又は妊娠していると思われる人</li> <li>・高齢者</li> <li>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>・高熱、むくみ、排尿困難の症状のある人</li> <li>・心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症の診断を受けた人</li> </ul> <p>【12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。】 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

### 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。