

## 医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	カゼリック液W「小児用」
2	成分・分量	1びん(30mL)中 アセトアミノフェン 450mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 16mg、 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg、カフェイ水和物 50mg
3	用法・用量	添付の計量カップで次の量をはかり、1日3回毎食後および必要な場合には就寝前に服用してください。また場合によっては1日6回まで服用しても差し支えありませんが、1日6回服用する場合には原則として約4時間の間隔をおいて服用してください。 3才～6才：2.5mL：1日3回、6ヵ月～2才：1.5mL：1日3回、 3ヵ月～5ヵ月：1.0mL：1日3回、3ヵ月未満：服用しないでください
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください            (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。            (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください            他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください</p> <p>4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>5. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>6. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師又は歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人</li> <li>・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>・高熱、排尿困難の症状のある人 ・甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症の診断を受けた人</li> </ul> <p>【6才以下の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。】  【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

### 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。