

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	コデポン
2	成分・分量	6 カプセル（大人 1 日量）中 ジヒドロコデインリン酸塩 … 18mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 … 40mg ノスカピン … 60mg グアイフェネシン … 300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 … 7.5mg 無水カフェイン … 150mg
3	用法・用量	次の量を水又は温湯で服用してください。 1回量： 大人(15歳以上) … 2 カプセル 8歳以上 15歳未満 … 1 カプセル 8歳未満は、服用しないこと。 1日服用回数： 3回 <u>※12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。</u>
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など） 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気などがあらわれることがあります。) 3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 4. 過量服用・長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください - 医師の治療を受けている人。 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。 - 高齢者。 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 - 次の症状のある人。 : 高熱、排尿困難 - 次の診断を受けた人。 : 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。