

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	コンタック®600プラス
2	成分・分量	4カプセル(成人の1日量)中 塩酸ブソイドエフェドリン 120mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg、ベラドンナ総アルカロイド 0.4mg、 無水カフェイン 100mg、リゾチーム塩酸塩 60mg(力価)
3	用法・用量	成人(15歳以上)1回2カプセル、7歳以上15歳未満1回1カプセル、1日2回(朝・夕)、水又はお湯と一緒に服用。 7歳未満は服用しないこと。
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和: くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2)次の症状のある人。前立腺肥大による排尿困難</p> <p>(3)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください</p> <p>他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー一用薬)、胃腸鎮痛鎮痙薬</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)</p> <p>4. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する方はお申し出ください</p> <p>(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)授乳中の人。</p> <p>(4)高齢者。(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6)かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。</p> <p>(7)次の症状のある人。高熱、排尿困難 (8)次の診断を受けた人。緑内障、腎臓病</p> <p>(9)モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人。</p> <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。