

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新エスタック「W」
2	成分・分量	4カプセル(成人1日量)中 アセトアミノフェン 480mg、サリチルアミド 400mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg、ノスカピン塩酸塩水和物 20mg、 カフェイン水和物 100mg、アスコルビン酸(ビタミンC) 100mg
3	用法・用量	次の1回量を1日2回、朝・夕食後に、水又はぬるま湯で服用してください。 成人(15才以上) 2カプセル 7～14才 1カプセル 7才未満 服用しないこと
4	効能・効果	かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する 内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください</p> <p>4. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>5. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師又は歯科医師の治療を受けている人。</li> <li>・妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>・水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。</li> <li>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>・次の症状のある人。 高熱、排尿困難</li> <li>・次の診断を受けた人。 心臓病、緑内障、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍</li> </ul> <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください】</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。