

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず外箱の表示を読んで下さい  
(本品には添付文書はついていません)

1	名称	インサイドテープ
2	成分・分量	膏体 100g(10,000cm <sup>2</sup> )中 インドメタシン 3.75g(3.75%)
3	用法・用量	表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。
4	効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)ぜんそくを起こしたことがある人。 2. 次の部位には使用しないでください (1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。 (3)みずむし、たむし等又は化膿している患部。 3. 連続して2週間以上使用しないでください  次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。