

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ピタリット
2	成分・分量	2錠中 塩酸ロペラミド 0.5mg ベルベリン塩化物水和物 75mg ビオヂアスターぜ 2000 45mg チアミン硝化物(ビタミンB ₁) 7.5mg リボフラビン(ビタミンB ₂) 3mg
3	用法・用量	次の量を1日2回、水又はぬるま湯で服用してください。下痢が止まれば服用しないでください。服用間隔は4時間以上おいてください。 成人(15歳以上) 1回2錠、15歳未満 服用しないこと
4	効能・効果	下痢、食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えによる下痢、腹痛を伴う下痢、食あたり、水あたり、軟便
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。) 4. 服用前後は飲酒しないでください 5. 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。 ・急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・吐き気等の症状を伴う下痢のある人。(本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることができます。) ・便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人。(本剤の服用により便秘が発現することがあります。) ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・授乳中の人は。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。