

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ネオデイ
2	成分・分量	2錠中 ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg
3	用法・用量	寝つきが悪い時や眠りが浅い時、下記の1回の量を、1日1回就寝前に水又はぬるま湯で服用してください。 大人(15歳以上) 1回2錠、15歳未満 服用しないこと
4	効能・効果	一時的な不眠の次の症状の緩和: 寝つきが悪い、眠りが浅い
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	- 次の人は服用しないでください (1)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (2)15歳未満の小児。 (3)日常的に不眠の人。 (4)不眠症の診断を受けた人。 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の催眠鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気をもよおして事故を起こすことがあります。また、本剤の服用により、翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じる場合は、これらの症状が消えるまで、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。) - 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください - 服用前後は飲酒しないでください - 寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用にとどめ、連用しないでください - 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 排尿困難 ・次の診断を受けた人。 緑内障、前立腺肥大 - 翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じる場合があります。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。