

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	サロメチールID1%スプレー
2	成分・分量	< 130 mL 中 > インドメタシン 603mg(原液1g中 10mg)、 / メントール 1,809mg(原液1g中 30mg)
3	用法・用量	1日4回を限度として適量を患部に噴霧又は塗布します。
4	効能・効果	筋肉痛、打撲、捻挫、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、 肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに伴う肩の痛み
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) ぜんそくを起こしたことがある人。 (3) 11歳未満の小児。 2. 次の部位には使用しないでください (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。 3. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。 (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。