

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ノアールSG
2	成分・分量	<15mL中> スルファメトキサゾールナトリウム 600mg、グリチルリチン酸二カリウム 15mg
3	用法・用量	1日3～6回、1回2～3滴ずつ点眼します。
4	効能・効果	結膜炎(はやり目)、ものもらい、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3)次の症状のある人。 はげしい目の痛み <用法・用量に関連する注意> ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。