医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	こどもリングルサット
2	成分･分量	＜12錠中＞ アセトアミノフェン　600mg
3	用法･用量	下記の1回服用量を、なるべく空腹時をさけ、かむか口中で溶かして服用します。 服用間隔は4時間以上おいてください。 ＜1回服用量＞11～14才　4錠、7～10才　3錠、5～6才　2錠、 5才未満　服用しないでください ＜1日服用回数＞3回を限度とします
4	効能･効果	頭痛･歯痛･抜歯後の疼痛･咽喉痛･耳痛･関節痛･神経痛･腰痛･筋肉痛･肩こり痛･打撲痛･骨折痛･ねんざ痛･月経痛（生理痛）･外傷痛の鎮痛、悪寒･発熱時の解熱
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1．次の人は服用しないでください （1）本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 （2）本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 2．本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬 3．服用時は飲酒しないでください 4．長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。 （3）高齢者。 （4）本人又は家族がアレルギー体質の人。 （5）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 （6）次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃･十二指腸潰瘍
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1．本紙の内容は、お客様が医薬品を購入･選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2．情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3．使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。