

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	エアミット
2	成分・分量	<2錠中> ジメンヒドリナート 50mg、臭化水素酸スコポラミン 150μg、 無水カフェイン 40mg
3	用法・用量	乗物酔いの予防には乗車船30分から1時間前に、下記の1回服用量を服用します。 なお、乗物酔いの症状が起こった時に追加服用する場合には同量を4時間以上の 間隔をおいて服用してください。 <1回服用量>大人(15才以上) 2錠、11~14才 1錠、 11才未満 服用しないでください <1日服用回数>3回を限度とします
4	効能・効果	乗物酔いによるめまい・はきけ・頭痛の予防及び緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を 含有する内服薬(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬) 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。) 3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 高齢者。 (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。 (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (6) 次の症状のある人。排尿困難 (7) 次の診断を受けた人。緑内障、心臓病
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

(注意事項)

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の
薬剤師または登録販売者にご相談下さい。