

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	サロメチールIDパップE
2	成分・分量	<膏体100g中(1枚は膏体14g)> インドメタシン 0.5g、トコフェロール酢酸エステル 0.3g、 グルチルレチン酸 0.05g
3	用法・用量	プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。 15歳未満の小児は使用しないでください。
4	効能・効果	腰痛、捻挫、筋肉痛、関節痛、打撲、肩こりに伴う肩の痛み、 腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)ぜんそくを起こしたことがある人。 (3)15歳未満の小児。 2. 次の部位には使用しないでください (1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。 (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。 3. 連続して2週間以上使用しないでください  次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。