

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ストナリニフィルム
2	成分・分量	<3枚中> d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg、ベラドンナ総アルカロイド 0.6mg
3	用法・用量	下記の1回服用量を口中で溶かして服用します。 ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。 <1回服用量>成人(15歳以上) 1枚、15歳未満 服用しないでください <1日服用回数>3回
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和： くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)15歳未満の小児。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー 用薬) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。) 4. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。 (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (6)次の症状のある人。高熱、排尿困難、口中の乾燥 (7)次の診断を受けた人。緑内障、心臓病
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。