

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第 3 類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 名称 | ビタミン BB - L 錠「クニヒロ」 |
| 2 | 成分・分量 | 1 日量(6 錠)中 ビタミン B ₂ 酪酸エステル(リボフラビン酪酸エステル)……………20mg ビタミン B ₆ (ピリドキシン塩酸塩)……………100mg ビタミン C(アスコルビン酸)……………500mg |
| 3 | 用法・用量 | 成人(15 歳以上)1 回 2 錠 1 日 1～3 回、11 歳以上 15 歳未満 1 回 2 錠 1 日 1～2 回、7 歳以上 11 歳未満 1 回 1 錠 1 日 1～3 回、3 歳以上 7 歳未満 1 回 1 錠 1 日 1～2 回、食後に口の中で溶かすか、またはかみくだいて服用してください。ただし、1 日 2 回服用する場合は朝夕、1 日 3 回服用する場合は朝昼晩服用してください。 <用法・用量に関連する注意> 3 歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないようよく注意してください。 |
| 4 | 効能・効果 | 次の諸症状の緩和：口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ「ただし、これらの症状について、1 ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談してください。」 次の場合のビタミン B ₂ B ₆ の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時 |
| 5 | 保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項 | |
| 6 | 薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項 | |

〔注意事項〕

- 1．本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2．情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3．使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。