

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新ファイトップ(細粒)
2	成分・分量	3包(4.5g)(1日量)中 重質酸化マグネシウム 400mg、炭酸水素ナトリウム 900mg、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 750mg、ロートエキス散 300mg、ゲンチアナ末 90mg、ケイヒ末 320mg、ショウキョウ末 60mg、ビオチンアスターゼ 500 150mg
3	用法・用量	成人(15才以上):1回1包、1日3回; 11才以上15才未満:1回2/3包、1日3回; 8才以上11才未満:1回1/2包、1日3回; 5才以上8才未満:1回1/3包、1日3回; 5才未満:服用しないこと 食後に水またはお湯にて服用してください。
4	効能・効果	胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、吐き気(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔気、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃痛、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、消化促進
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください 透析療法を受けている人 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。) 4. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・排尿困難の症状のある人。 ・腎臓病、心臓病、緑内障の診断を受けた人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。