

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	クールメトテック
2	成分・分量	<膏体 100g (1000cm ²) 中> サリチル酸メチル 0.5g、L メントール 0.3g、dl-カンフル 0.5g、酢酸トコフェロール 0.3g 添加物としてエデト酸 Na、カオリン、酸化チタン、CMC - Na、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、D-ソルビトール、グリセリン、酒石酸、ポリソルベート 80、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシビニルポリマー、ヒマシ油を含有します。
3	用法・用量	表面のフィルムをはがして、1日1~2回患部に貼付して下さい。必要な時は、包帯又はテープでとめて下さい。
4	効能・効果	腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、骨折痛、しもやけ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります] 次の部位には使用しないで下さい。 (1)目の周囲、粘膜等、(2)湿疹、かぶれ、傷口</p> <p>相談すること 1、次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。 (1)本人又は家族がアレルギー体质の人 (2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2、次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。 (1)使用後、次の症状が現れ場合 関係部位：皮ふ 症状：発疹・発赤、かゆみ、はれ等 (2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

(注意事項)

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。