

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名称	パイロン99鼻炎内服液
2	成分・分量	6包(10mL×6・大人1日最大量)中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg, 塩酸プソイドエフェドリン 180mg, ベラドンナ総アルカロイド 0.6mg, グリチルリチン酸ニカリウム 40mg, 無水カフェイン 150mg
3	用法・用量	次の量をおのみください。ただし、おのみになる間隔は約4時間以上おいてください。 大人(15才以上):1回1包, 1日3~6回 15才未満:服用させないこと
4	効能・効果	急性鼻炎, アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による次の諸症状の緩和: くしゃみ, 鼻みず, 鼻づまり, なみだ目, のどの痛み, 頭重(頭が重い)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人 (2)次の症状のある人 前立腺肥大による排尿困難 (3)次の診断を受けた人 高血圧, 心臓病, 甲状腺機能障害, 糖尿病 2. 本剤を服用している間は, 次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の鼻炎用内服薬, 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(かぜ薬, 鎮咳去痰薬, 乗物酔い薬, アレルギー用薬など), 胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 服用後, 乗物または機械類の運転操作をしないでください (眠気や目のかすみ, 異常なまぶしさなどの症状があらわれることがあります) 4. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦または妊娠していると思われる人 (3)授乳中の人 (4)高齢者 (5)薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人 (6)かぜ薬, 鎮咳去痰薬, 鼻炎用内服薬などにより, 不眠, めまい, 脱力感, 震え, 動悸をおこしたことがある人 (7)次の症状のある人 高熱, 排尿困難 (8)次の診断を受けた人 緑内障, 腎臓病 (9)モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩など)で治療を受けている人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。