

## 医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| 1 | 名称                    | ベンザブロック IP プラス錠  |
| 2 | 成分・分量                 | 9錠(1日服用量)中 イブプロフェン 360mg、アセトアミノフェン 180mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、無水カフェイン 75mg、アスコルビン酸カルシウム 500mg、ヘスペリジン 90mg  |
| 3 | 用法・用量                 | 15歳以上 1回 3錠、1日 3回、食後なるべく30分以内に、水またはお湯で、かまずに服用  |
| 4 | 効能・効果                 | かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、鼻水、鼻づまり、筋肉の痛み、せき、たん、くしゃみ)の緩和   |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | <p>1. 次の人は服用しないで下さい<br/>           (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人<br/>           (2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人<br/>           (3) 15歳未満の小児<br/>           (4) 出産予定日12週以内の妊婦</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい<br/>           他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗り物酔い用薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)</p> <p>3. 服用後、乗り物または機械類の運転操作をしないで下さい</p> <p>4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい</p> <p>5. 服用前後は飲酒しないで下さい</p> <p>6. 5日を超えて服用しないで下さい</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい<br/>           - 医師または歯科医師の治療を受けている人<br/>           - 妊婦または妊娠していると思われる人<br/>           - 高齢者<br/>           - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人<br/>           - 次の症状のある人<br/>           - 高熱、排尿困難<br/>           - 次の診断を受けた人<br/>           - 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症<br/>           - 次の病気にかかったことのある人<br/>           - 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病</p> |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 |  |

### [注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。