

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	タケダ乗り物酔い止め
2	成分・分量	2錠(15歳以上の1回量および7歳~14歳の1日最大服用量)中 塩酸メクリジン 25mg、スコポラミン臭化水素酸塩水和物 0.25mg
		添加物 アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)
3	用法・用量	乗り物酔いの予防には、乗り物に乗る30分前に15歳以上1回2錠、7歳~14歳1回1錠をかむか、口中で溶かして服用、4時間以上の間隔をおいて1日2回まで
4	効能・効果	乗り物酔いによる めまい・吐き気・頭痛の予防および緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい 他の乗り物酔い用薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去たん薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)</p> <p>2. 服用後、乗り物または機械類の運転操作をしないで下さい 次に該当する人はお申し出下さい</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人 排尿困難 ・次の診断を受けた人 フェニルケトン尿症、緑内障、心臓病 ・副交感神経遮断剤(ペラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロパミド、ロートエキス等)を含有する内服薬を服用している人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2012. 7】