

## 医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ニコレット、ニコレット・ミント、ニコレットクールミント、ニコレットフルーティミント、ニコレットアイスマント
2	成分・分量	1個中 ニコチン 2mg
3	用法・用量	タバコを吸いたいと思ったとき、1回1個をゆっくりと間をおきながら、30~60分間かけてかんでください。通常、1日 4~12 個から始めて適宜増減し、1日の総使用個数は24個を超えないようにしてください。使用開始時の1日の使用個数の目安は、禁煙前の1日の喫煙本数が20本以下では4~6個、21~30本では6~9個、31本以上では9~12個になります。禁煙になれてきたら(1ヶ月前後)、1週間ごとに1日の使用個数を1~2個ずつ減らし、1日の使用個数が1~2個となった段階で使用をやめください。使用期間は3ヶ月をめどとしてください。
4	効能・効果	禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 次の人は使用しないでください           <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 非喫煙者[タバコを吸ったことのない人及び現在タバコを吸っていない人]</li> <li>(2) すでに他のニコチン製剤を使用している人</li> <li>(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人</li> <li>(4) 重い心臓病を有する人 ・3ヶ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人 ・重い狭心症と医師に診断された人 ・重い不整脈と医師に診断された人</li> <li>(5) 急性期脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)と医師に診断された人</li> <li>(6) うつ病と医師に診断された人</li> <li>(7) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人</li> <li>(8) あごの関節に障害がある人</li> </ol> </li> <li>2. 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けてください</li> <li>3. 本剤を使用中あるいは使用直後に次のことをしないでください           <ul style="list-style-type: none"> <li>・喫煙 ・ニコチンパッチ製剤の使用</li> <li>4. 6ヶ月を超えて使用しないこと</li> </ul> </li> </ol> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師又は歯科医師の治療を受けている人 ・他の薬を使用している人</li> <li>・高齢者及び20歳未満の人 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>・次の症状のある人 腹痛、胸痛、口内炎、のどの痛み・のどのはれ</li> <li>・次の診断を受けた人 心臓疾患(心筋梗塞、狭心症、不整脈)、脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)、バージャー病(末梢血管障害)、高血圧、甲状腺機能障害、褐色細胞腫、糖尿病(インスリン製剤を使用している人)、咽頭炎、食道炎、胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病</li> </ul>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

### [注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2012.10】