

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アネトンせき止め液 分包
2	成分・分量	6包<1包 10mL>(成人1日量)中 コデインリン酸塩水和物(リン酸コデイン) 50mg、 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg、無水カフェイン 60mg、 セネガ流エキス 1500mg
3	用法・用量	成人(15歳以上)1回1包(10mL)を、1日3回、症状により約4時間の間隔を置いて 1日6回まで服用することができる。
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 15歳未満の小児 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 過量服用・長期連用しないでください <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

【2019. 7】