

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新ルビカップ
2	成分・分量	3包(成人1日量)中 ジヒドロコデインリン酸塩 30mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg、リゾチーム塩酸塩 60mg
3	用法・用量	次の1回量を1日3回食後に服用する 成人(15才以上):1包、11才以上15才未満:2/3包、8才以上11才未満:1/2包、 5才以上8才未満:1/3包、3才以上5才未満:1/4包 3才未満:服用しないこと 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
4	効能・効果	せき, たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないこと 本剤または鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他の鎮咳去痰薬, かぜ薬, 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬, 乗物酔い薬, アレルギー用薬), 鎮静薬 3. 服用後, 乗物または機械類の運転操作をしないこと 次に該当する人はお申し出下さい ・医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人・授乳中の人 ・本人または家族がアレルギー体質の人 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・高熱、排尿困難の症状のある人 ・緑内障の診断を受けた人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。