

医薬部外品

※：2007年4月に改訂しました。

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

整腸、腹部膨満感、軟便、便秘に

ヤクルトBL整腸薬S錠

○小腸でも大腸でも作用を発揮します。

ヤクルトBL整腸薬S錠は、主として大腸で作用するビフィズス菌 (*Bifidobacterium breve*) と主として小腸で作用するカゼイ菌 (*Lactobacillus casei*) の活性生菌およびカルニチン塩化物を含有していますので、広範な消化管で作用を発揮します。

○優れた整腸作用を発揮します。

ヤクルトBL整腸薬S錠は、生きたビフィズス菌とカゼイ菌が小腸から大腸にかけてよく増殖し、乳酸や酢酸を産生し腸内を弱酸性にして、悪玉菌の増殖を抑制すると共に腸管運動を促進して、整腸効果を高めます。

○ヤクルトBL整腸薬S錠は、イチゴ風味のチュアブル錠で、口中で溶かして服用いただけますので、小児からお年寄りまで容易に服用できます。



使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 牛乳によるアレルギーを起こしたことがある人。
 - 医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
2週間位服用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後にかむか、口中で溶かして服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
8歳以上15歳未満	2錠	
5歳以上8歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. ビンの中の包装紙に包まれた錠剤は、乾燥剤ですので服用しないでください。

また、最初に服用する際には、詰め物を取り出して捨ててください（この詰め物は、輸送時の振動等による錠剤の破損を防ぐためのものです。これを出し入れすると異物混入の原因になることがあります）。

成分・分量と働き

9錠(成人の1日服用量)中

成分	分量	働き
カルニチン塩化物	120mg	消化管の機能を整えます。
カゼイ菌	60mg	主に小腸で増殖し、乳酸を産生し、整腸作用をあらわします。
ビフィズス菌	45mg	主に大腸で増殖し、乳酸や酢酸を産生し、整腸作用をあらわします。

添加物として香料、アメ粉、白糖、ポビドン、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります)。
4. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。
5. 開封後は、フタを閉めて保管してください。

ビフィズス菌やカゼイ菌の有用性

腸内には、多くの腸内細菌が常在していて、善玉菌と呼ばれるビフィズス菌やカゼイ菌などと悪玉菌と呼ばれる腸内腐敗菌などがあり、バランスを保ちながら私達の健康と深くかかわっています。

ところが、病気、食事の偏り、外来菌の侵入、ストレス、気候の変化や年齢などの影響により悪玉菌が増え腸内細菌のバランスが乱れ、下痢や便秘などといった症状を引き起こすことがあります。また、症状がない場合でも腸内環境の悪化は、腸の機能を低下させる原因となります。

善玉菌のビフィズス菌やカゼイ菌は、乳酸や酢酸などを産生して、腸内の悪玉菌(ウエルシュ菌、大腸菌など)の異常な増殖を抑え、腸の働きを整えて私達の健康維持に役立ちます。

【包装】

27錠、108錠

※【お問い合わせ先】

本剤に関して、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店または下記までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

株式会社ヤクルト本社 医薬営業部 学術課

〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル

電話：03(5550)8964

受付時間：9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社ヤクルト本社**

〒105-8660 東京都港区東新橋1-1-19

706VIV01 0812A