

リキセーG

〔使用上の注意〕

相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、下痢

- 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔成分・分量〕 1日量1本(50mL)中

チアミン硝酸塩…10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム…5mg、ピリドキシン塩酸塩…10mg、ニコチン酸アミド…20mg、無水カフェイン…50mg、タウリン…1500mg、L-アルギニン塩酸塩…50mg、ローヤルゼリー抽出液…200mg(ローヤルゼリー200mgに相当)、ゴオウ抽出液…50 μ L(ゴオウ1mgに相当)、ロクジョウチンキ…50 μ L(ロクジョウ14.3mgに相当)、イカリソウ流エキス…0.15mL(イカリソウ150mgに相当)、ニンジンエキス…55mg(ニンジン610mgに相当)
 添加物：白糖、D-ソルビトール、dl-リンゴ酸、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、カラメル、マクロゴール、メタリン酸Na、香料、プロピレングリコール
 「(アルコール0.35mL以下)」

- 本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

AL05



滋養強壮・栄養補給

リキセーG

タウリン1500mg

ニンジン・ロクジョウ・ゴオウ・ローヤルゼリー
 ビタミンB1・B2・B6配合



第2類医薬品

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用する。
 ●用法及び用量を厳守すること。●本剤は、まれに沈殿を生じることがあります。よく振って服用すること。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5)加温、冷凍はさけること。

副作用被害救済制度
 電話:0120-149-931

製造販売元 田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)