

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

説明文書改訂年月
2012年9月
(記載要領変更に伴う改訂)

Ⓒ

ヘルспанEα

第3類医薬品

(ビタミンE主薬製剤)

⚠ 使用上の注意



相談すること

1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- ① 医師の治療を受けている人。
- ② 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ③ 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

便秘、下痢

4 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

5 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

用法・用量

成人(15歳以上)1回1カプセル, 1日3回食後服用する。

年 令	1 回 量	服用回数
成 人 15 歳以上	1カプセル	1日3回
15歳未満	服用しない ×	

効能・効果

末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ

更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ

月経不順

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。」

次の場合のビタミンEの補給：老年期



裏面もお読み下さい→


成分・分量

成分	1日量(3カプセル)中
d- α -トコフェロール(ビタミンE)	300.0mg
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB ₁ 誘導体)	27.3mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	30.0mg
イノシトールヘキサニコチン酸エステル	150.0mg
ガンマーオリザノール	10.0mg

添加物としてグリセリン脂肪酸エステル, サラシミツロウ, 中鎖脂肪酸トリグリセリド, カプセル剤皮の成分は, ゼラチン, 濃グリセリン及び酸化チタンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 1 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 2 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 3 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 4 水分がカプセルに付きますと, 内容成分の変化の原因となりますので, 誤って水滴を落としたり, めれた手で触れないで下さい。
- 5 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

発売元：明治薬品株式会社お客様相談室

電話：☎0120-53-3451

受付時間：9:00~17:00(土, 日, 祝日, 特定休日を除く)

発売元：天野商事株式会社 お客様相談室


電話：052-951-2340

受付時間：9:00~17:00(土, 日, 祝日, 特定休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元
 **明治薬品株式会社**
富山県富山市三郷6番地

発売元
 **天野商事株式会社**
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元
 **明治薬品株式会社**
富山県富山市三郷6番地