

〔販売名〕ギルメサゾンS

〔成分・分量〕デキサメタゾン0.025g、クロタミン10g、イソプロピルメチルフェノール0.1g

100g中（油脂性軟膏基剤）添加物としてゲル化炭化水素を含んでいます。

〔効能・効果〕湿疹、かぶれ、皮膚炎、じんましん、あせも、かゆみ、虫さされ 【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布又は塗擦してください。

〔用法・用量に関連する注意〕(1)用法を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

〔使用時のアドバイス〕●軟膏は厚く塗る必要はありません。薄く患部に塗るだけで十分な効果を示します。●軟膏を塗りかえる時は、前回に塗った所の軟膏や汚れを、強くこすらないように、ガーゼや脱脂綿で、できるだけ落としてから、新たに軟膏を塗布してください。

この説明文は、使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないでください 水痘（水ぼうそう）、みずむしたむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください 3. 長期連用しないでください

📌 **相談すること** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部が広範囲の人。(5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚（患部）	みずむしたむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔保管及び取扱い上の注意〕1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。2. 小児の手のとどかない所に保管してください。3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。4. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。



製造販売元

三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18



副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
0120-149-931 (フリーダイヤル)

製品についてのお問合せは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂けますようお願い申し上げます。

〔お客様相談室〕電話 03-3952-0100

月～金曜日 9:00～17:00 (祝日を除く)